

Alcune

**SPECIALITÀ
MEDICINALI**

MERCK E CILAG

BRACCO

S.p.A.

HAU-MERCK

SOCIETÀ PER AZIONI

MILANO - VIA R. FUCINI, 2

BETABION

Vitamina B₁ pura, crist.: polineuriti, nevralgie, herpes zoster, turbe cardiovascolari da avitaminosi, paralisi, ecc.

Rp.:

tubo di 20 e flac. di 100 compr. di 3 mg,
scat. di 3 e di 15 fiale di 5 mg in 1 cc.
4-6 compr. al dì o 1-2 fiale pro die endomuscolo, endovena.

BETABION « FORTE »

tubo di 10 e flac. di 50 compr. di 50 mg,
scat. di 3 e di 15 fiale di 25 mg in 1 cc.
1-4 compr. pro die o 1-2 fiale al dì endomuscolo, endovena.

BETABION « FORTISSIMUM »

scat. di 3 e di 15 fiale di 100 mg in 2 cc.
1 fiale pro die preferibilmente endomuscolo.

CEBION

Vitamina C pura, crist.: diatesi emorragiche, anemie ipocromiche, stanchezza primaverile, malattie infettive (grippe, polmonite, difterite, tubercolosi, ecc.), ulcera gastroduodenale, malattie reumatiche, intossicazioni, turbe endocrine, gengiviti, turbe della dentizione, ecc.

Rp.:

tubo di 20 e flac. di 100 compr. di 50 mg,
scat. di 10 fiale di 50 mg in 1 cc e di 5 fiale di 100 mg in 2 cc.
Per profilassi 1-2 ed anche più compr. al dì; per terapia
1 o più fiale al dì endovena, sottocute o endomuscolo.

CEBION « FORTE »

tubo di 10 e flac. di 50 compr. di 200 mg,
scat. di 3 e di 15 fiale di 500 mg in 5 cc.
3-5 compr. al dì; 1-2 o più fiale al dì endovena, sottocute
o endomuscolo.

CEBION « FORTISSIMUM »

tubo di 10 compr. di 500 mg,
scat. di 3 fiale di 1 g in 5 cc.
1-2 compr. al dì; 1 o più fiale pro die endovena o endomuscolo.

CEBION-PASTA

tubo di 15 g circa.
Con la quantità di un pisello eseguire massaggio sulle
gengive 3-4 volte al dì.

DIGIMERCK

Digitossina pura, crist. « Merck ». Regolatore e tonico del cuore: insufficienza cardiaca cronica e acuta, ipotonia del miocardio durante malattie infettive, ecc.

Rp.:

tubo di 20 compr. di 0,1 mg,
scat. di 5 e di 10 supposte di 0,25 mg.
scat. di 5 fiale di 0,25 mg in 1 cc.
Posologia strettamente individuale.

DIGIMERCK-GOCCE

flaconcino contagocce di 10 cc (1 cc=30 gocce= $\frac{1}{10}$ di mg di digitossina).

Posologia strettamente individuale.

EMEDIAN

1 conjetto contiene: diidroergocristina 0,2 mg, benzilpseudotropicina 0,2 mg, N-metiletilfenilmalonilurea (Prominal) 30 mg - Distonie vegetative, neurosi di organi e di vasi, turbe del sistema vegetativo durante malattie infettive, accentuata attività tiroidea, cinetosi, ecc.

Rp.:

flac. di 20 e di 100 confetti.
1 conjetto 1-2 volte al dì.

EVION

Vitamina E; α -tocoferolo acetato di sintesi - Aborto abituale, diatesi all'aborto, sterilità, neuromiopatie, turbe della virilità e del climaterio, turbe vasali periferiche, debilità senile, ulcus cruris, sclerodermie, ecc.

Rp.:

tubo di 20 confetti di 10 mg,
scat. di 5 fiale di 30 mg in 1 cc.
1-3 confetti pro die, oppure 1 fiala al dì endomuscolo.

EVION « FORTE »

tubo di 10 e flac. di 20 conf. di 100 mg,
scat. di 5 fiale di 300 mg in 2 cc.

Contro malattie neuromuscolari, turbe dell'irrorazione sanguigna, malattie degenerative del tessuto connettivo, 3 conf. al dì eventualmente anche per mesi, oppure 1 fiala al dì.

HEPRACTON B₁₂

Estratto integrale di fegato con aggiunta di vitamina B₁₂ (10 γ pro cc), vitamina B₁, vitamina B₂ e amide dell'acido nicotinico - Anemia perniciosa, anemia gravidica ed anemie secondarie specie per affezioni croniche, azotemia, sprue, stati di deperimento, epatosi, ecc.

Rp.:

scat. di 5 fiale di 2 cc,

scat. di 3 fiale di 5 cc.

Profondamente nei glutei 2 cc pro die, indi a giorni alterni, oppure 5-10 cc la settimana.

MAGNORBIN

Magnesio ascorbato per iniezioni - Tetano, spasmofilia, spasmi vasali, ipertensione, distonia vegetativa, epilessia, turbe della circolazione periferica, narcosi, osmoterapia, reazioni flogistiche cutanee, malattie allergiche, eclampsia, ecc.

Rp.:

scat. di 5 fiale di 5 cc al 10 %,

scat. di 5 fiale di 5 cc al 20 %.

Posologia secondo le indicazioni; la soluzione al 10 % è indicata nei casi meno gravi, mentre quella al 20 % è indicata per ottenere un effetto più intenso.

POLYBION

Combinazione delle principali sostanze attive del complesso B dosate secondo necessità fisiologica.

Convalescenza, deficienza di peso, senilità, gravidanza, ipertireosi, stomatite, glossite, epatopatie parenchimatose, anoressia ostinata, sindromi neurodistrofiche, vomito gravidico, male da raggi, ecc.

1 confetto di Polybion contiene: vit. B₁ (aneurina) 5 mg - vit. B₂ (lattoflavina) 2 mg - vit. B₆ (adermina) 2 mg - amide dell'acido nicotinico 20 mg - sale calcico dell'ac. pantotenico 3 mg.

Rp.:

flac. di 20 confetti.

1 conf. 3 volte al dì, ai bambini metà dose.

POLYBION-GOCCE

1 flaconcino di 20 cc di Polybion-gocce contiene: vit. B₁ 50 mg - vit. B₂ 10 mg - vit. B₆ 20 mg - amide dell'ac. nicotinico 150 mg - pantotenolo 30 mg.

Rp.:

flac. contagocce di 20 cc.

10-15 gocce tre volte al dì, ai bambini metà dose, ai lattanti 5 gocce 3 volte al dì.

POLYBION « FORTE »

1 confetto di Polybion « forte » contiene: vit. B₁ 15 mg - vit. B₂ 15 mg - vit. B₆ 10 mg - amide dell'ac. nicotinic 50 mg - sale calcico dell'ac. pantotenico 25 mg.

Rp.:

flac. di 20 confetti.

1 confetto 3 volte al dì.

ADYSMEN

Antidismenorroico, analgesico, spasmolitico.

Comprese: 1-nicotilamino-1,2-difeniletano (Lyspamin) 0,35 g - dimetilaminofenazone 0,20 g - caffeina 0,05 g.

Confetti: 1-nicotilamino-1,2-difeniletano (Lyspamin) 0,117 g - dimetilaminofenazone 0,067 g - caffeina 0,016 g.

Supposte: 1-nicotilamino-1,2-difeniletano (Lyspamin) 0,40 g - dimetilaminofenazone 0,20 g - caffeina 0,05 g.

Rp.:

tubo di 6 e flac. di 30 compresse.

scat. di 20 confetti.

scat. di 6 supposte.

Per prevenire l'accesso 1-2 compresse o 2-4 confetti oppure 1-2 supposte pro die; per combatterlo 2-3 compresse o 4-6 confetti oppure 2-3 supposte nelle 24 ore.

BILAMID

Amide ossimetilica dell'acido piridin-3-carbonico; contro stiticosi epato-bili-enteriche. Combatte la dispepsia da latte dei lattanti. Assieme a Piridacil (vedasi questo) contro pielite, pielocistite.

Rp.:

tubo di 20 e flac. di 50 compr. di 0,5 g,

scat. di 5 fiale di 10 cc soluzione al 4 %.

1-2 compr. 3 volte al dì dopo i pasti; si possono inoltre somministrare, solo endovena, 1-2 fiale pro die. Ai lattanti 1 compr. al dì frazionata in 3-4 volte.

BILAMID-COLINA

Amide ossimetilica dell'acido piridin-3-carbonico e colina - Epatopatie infettive e tossiche, epatiti sierose, stati postepatitici e precirrotici, steatosi epatica, dermatosi da alterato ricambio, vomito gravidico, eclampsia, male da raggi, ecc.

Rp.:

Confetti: flac. di 60 confetti.

4 volte al giorno 2-4 confetti durante i pasti.

Granulato: flac. di 50 g (con misurino).

1-2 misurini al giorno durante i pasti.

CARBONE COMPOSTO-CILAG al Guanicil

Antidiarroico, antibacillare; contro le malattie gastrointestinali specie bacillari.

Comprese: carbone medic. 0,13 g, Guanicil 0,13 g, bismuto sotto-nitrato 0,04 g, pectina 0,04 g, glucosio ed eccip. q. b. a 0,70 g.

Granulato: carbone medic. 10 g, Guanicil 7,5 g, bismuto sotto-nitrato 2,5 g, caolino 5 g, pectina 2,5 g, glucosio ad 50 g.

Rp.:

Comprese: tubo di 20 compr.

Agli adulti subito 3 compr., dopo 2 ore 2 compr., indi ogni 3 ore 2 compr.; ai bambini metà dose.

Granulato: barattolo di 50 g.

Agli adulti 3-4 cucchiaini pro die; ai bambini metà dose.

DIAZIL

2-(p-aminobenzolsoljanilamino)-1,6-dime-ilpirimidina. Il più tollerato ed il più attivo solfonamidico. Contro broncopolmonite, polmonite, meningite, gonorrea, erisipela, cistopielite, sepsi lenta, piuria, ecc.

Rp.:

Comprese

tubo di 20 compresse di 0,5 g.

Adulti: subito 4-6 compr., poi 2 compr. ogni 4 ore o 3 ogni 6 ore. Ragazzi e bambini in proporzione all'età e al peso.

Fiale

scat. di 5 fiale di 5 cc soluz. al 20 %.

Adulti: 1-3 fiale pro die endomuscolo o endovena. Ragazzi e bambini in proporzione al peso e all'età.

Supposte per adulti

scat. di 10 supp. di 1 g.

Subito 2 supp., indi 1 supp. ogni 3 ore, poi ogni 6 ore.

Supposte per bambini

scat. di 10 supposte di 0,5 g.

Subito 1-2 supposte, indi 1 supp. ogni 3 ore, poi ogni 6 ore.

Sostanza per ricettazione

flac. di 10, 50, 100 g di Diazil e Diazil sodico.

DIAZIL-SCIROPPO al 10 %

flac. di 100 g.

Lattanti 3-4 cucchiaini nelle 24 ore; bambini 1 cucchiaino ogni 4 ore; ragazzi 1 cucchiaino ogni 3 ore; adulti 1 cucchiaino e più ogni 3 ore.

1 cucchiaino di sciroppo corrisponde a circa 0,5 g di sostanza attiva, pari ad 1 compressa di Diazil.

DIAZIL-POLVERE per uso chirurgico

flaconcino di 3 g.

Sostanza sterile priva di eccipienti per uso topico in cavità operatorie, piaghe, ferite, ecc.

DIAZIL-POMATA OFTALMICA al 5 %

tubo di 10 g.

Contro le infezioni batteriche degli occhi; introdurre sotto le palpebre quanto un chicco di grano, indi massaggiare.

DIAZIL-PENICILLINA

Chemo-antibioticoaterapico attivo per via orale. - Una compressa contiene: 0,5 g di Diazil e 100.000 U.I. di penicillina G procaina. Associata a Diazil la penicillina è attiva anche per via orale ed anche contro batteri penicillino-resistenti. - Polmoniti, broncopolmoniti, tonsilliti, meningiti, ecc.

Rp.:

tubo di 12 compresse.

Inizialmente 3-4 compr., poi 2 compr. 3-4 volte al giorno. Dare contemporaneamente liquidi alcalini abbondanti.

LYSOBEX (novità)

Bromuro di trimetil-(1,2-difeniletostietil)-ammonio. - Stati di irritazione delle vie aeree superiori. Tosse per fenomeni acuti o cronici di rinosfaringite, di bronchite, di broncopolmonite. Tosse dei tubercolotici. Pertosse o tosse postuma a pertosse. Tossi stizzose riflesse da irritazione pleurica, bronchiale e mediastinica. Tosse cronica dei fumatori.

Rp.:

flaconcino contagocce di 15 cc (1 cc=0,12 g),
scatola di 30 confetti di 0,03 g.

Lattanti: 1-3 gocce 2-3 volte al dì; bambini: 4-5 gocce 2-3 volte al dì; ragazzi e adulti: 7 gocce e più, oppure 1 confetto 2-3 volte al dì lontano dai pasti. Diluire le gocce in liquidi gradevoli.

LYSPAMIN

1-nicotilamino-1,2-difeniletano + feniletilmalonilurea. Il Lyspamin per uso pediatrico ed il « forte » non contengono feniletilmalonilurea. - Spasmolitico della muscolatura liscia e striata: spazmi del sistema circolatorio, specie angina pectoris, delle vie biliari, dell'apparato digerente e urinario; pseudo-croup, pilorospasmo dei lattanti, ecc.

Rp.:

tubo di 10 compr. di 0,30 g.
scat. di 5 supposte di 0,50 g.
½-1 compr. 3-4 volte al dì; 2-3 supposte pro die.

LYSPAMIN PER USO PEDIATRICO

scat. di 5 supposte di 0,40 g.
1-3 supposte al dì.

LYSPAMIN « FORTE »

scat. di 2 e di 6 supposte di 1 g.
1-2 supposte durante il periodo di dilatazione, o secondo necessità nelle altre indicazioni.

PIRIDACIL

Cloridr. della 2-fenilazo-2,6-diaminopiridina. Antisettico perorale con spiccato tropismo per reni e vescica. Contro cistite, pielite, cistopielite, pielonefrite (assieme a Bilamid, vedi questo), fluor cervicale, ecc.

Rp.: tubo di 20 confetti di 0,1 g.
Bambini 1-2 confetti, ragazzi 2-4, adulti 2 confetti 3-4 volte al dì, dopo i pasti.

STRAMINOL

Cloruro di dodecil-carbamil-metil-benzil-dimetilammonio. Detergente, disinfettante, antisettico, battericida, fungicida; per la disinfezione e la sterilizzazione delle mani e della cute, di strumenti chirurgici, biancheria, stoviglie, per irrigazioni vaginali, vescicali, per il trattamento di ferite, per prevenire e curare affezioni infiammatorie della bocca e della faringe.

Rp.:

Sostanza

scatola di 10 bustine di 1 g.

Soluzione acquosa al 10 %

flacone di 100 cc.

Unguento vulnerario allo 0,1 %

tubo di 20 g.

Polvere vulneraria all'1 %

barattolo di 20 g.

Tintura all'1 %

flacone contagocce di 20 cc.

Comprese di 1 mg

scatola di 30 compresse.

Collutorio al 4 %

flacone spruzzatore di 50 cc.

ALTRE SPECIALITÀ *Merck*

CREMA « MERCK » all'Efetonina - tubo di 15 g

CYTOBION - 3 fiale

CYTOBION « forte » - 3 fiale

CYTOBION « fortissimum » - 1 fiala

DIOGENAL - flaconcino di 1 g

DIONINA - 20 compr. - 10 fiale

DORYL - 20 compr. - 10 fiale - flac. di 10 cc

EFEDRALINA - 3 e 10 fiale

EFEDRINA « MERCK » - 10 e 20 compr. - 10 fiale

EFETONINA - 10 e 20 compr. - 50 perline - 10 fiale

EGRESSIN - 6 e 12 compr.

ESTROMENIN - 20 compr. - 5 fiale

ESTROMENIN « forte » - 5 fiale

ESTROMENIN-gocce - flac. di 20 cc

ESTROMENIN-unguento - tubo di 20 g

ESTROMENIN-deposito - 3 fiale

EUBOLDINA - 50 perline

EUCODALE (stupefacente) - 10 e 20 compr. di 0,005 g -
5 e 10 fiale di 0,01 g - 5 e 10 fiale di 0,02 g

EUPACO - 10 e 20 compr. - 3 e 10 fiale - 5 e 10 supp.

EUPAVERINA - 10 e 20 compr. - 5 e 10 fiale

EUPAVERINA « forte » - 5 fiale

GLICEROFOSFATO DI CALCIO « MERCK » - flac. di 25 g

HEXOBION - 20 compr. - 3 fiale - 5 e 10 supp.

KARANUM - 20 compr. - 5 fiale

LUMINALE - 10 compr. di 0,10 g - 10 compr. di 0,30 g -
10 fiale

LUMINALETTE - 30 compr.

ELISIR DI LUMINALE - flac. originale

MINDOL-MERCK - bust. di 2, tubo di 10 e flac. di 50 compr.

NEOBARIO - scat. di 150 g

NICOTA - 10 compr. - 10 fiale

ALTRE SPECIALITÀ *Merck*

NOVOTRANS - 2 e 5 fiale

OPTONICUM - flac. originale

PANODORM - 10 compr.

PANODORM-CALCIUM - 10 compr.

PROMINAL - 10 e 50 compr.

PROMINALETTE - 30 compr.

SCIROPPO « MERCK » all'Efetonina contro la tosse -
flac. originale

SCOFEDAL (stupefacente) - 10 fiale

SCOFEDAL « forte » (stupefacente) - 10 fiale

STIPTICINA - 20 conf. - 5 fiale

ULTRACARBO - baratt. di 50 g - 50 compr.

VIGANTOLO - flac. di 10 cc - 50 conf.

VIGANTOLO « forte » - 1 fiala

VIGANTOLO « fortissimum » - 1 fiala

ALTRE SPECIALITÀ *CILAG*

CILOPRIN - flac. di 6 g

DESULAN - 14 compr. ovoid.

GUANICIL - 20 compr.

GUANICIL-sciroppo al 10 % - flac. di 100 g

IDRAZIL - 50 compr.

LAMBRATENE - 3 fiale - 30 e 60 confetti

METURAL - 18 e 36 compr.

PAS-CILAG - 100 compr. - 5 fiale

PERMEASE - 2 fiale

PIRALDINA - 50 compr.

SOLFONE-CILAG - 5 fiale

MEZZI DI CONTRASTO

CISTOBIL - tubo di 1 dose (6 compr.)

JODOBIL - flac. di 1 dose

JODURON 20 % - 1 fiala di 10 cc

JODURON 30 % - 1 fiala di 5, 10 e 20 cc

JODURON 50 % - 1 fiala di 10 e 20 cc

JODURON 70 % - 1 fiala di 10 e 20 cc - flac. di 50 cc

JODURON « B » - flac. di 20 e di 100 cc

JODURON « S » - 1 fiala di 5 e di 10 cc

TRIOPAC « 200 » - 1 fiala di 20 cc

TRIOPAC « 300 » - 1 fiala di 20 cc

TRIOPAC « 400 » - 1 fiala di 20 cc



Direttore responsabile: Dott. Tullio Bracco

INDUSTRIA
EB
CHIMICA

743/1056 - I. E. I. - Milano