



Alcune SPECIALITÀ MEDICINALI

BRACCO
INDUSTRIA CHIMICA S. p. A.
MILANO

ADYSMEN

Antidismenorroico, analgesico, spasmolitico.

Comprese: 1-nicotilamino-1,2-difeniletano (*Lyspamin*) 0,35 g - dimetilaminofenazone 0,20 g - caffeina 0,05 g.

Confetti: 1-nicotilamino-1,2-difeniletano (*Lyspamin*) 0,117 g - dimetilaminofenazone 0,067 g - caffeina 0,016 g.

Supposte: 1-nicotilamino-1,2-difeniletano (*Lyspamin*) 0,40 g - dimetilaminofenazone 0,20 g - caffeina 0,05 g.

Rp.:

tubo di 6 e flac. di 30 compresse,
scat. di 20 confetti,
scat. di 6 supposte.

Per prevenire l'accesso 1-2 compresse o 2-4 confetti oppure 1-2 supposte pro die; per combatterlo 2-3 compresse o 4-6 confetti oppure 2-3 supposte nelle 24 ore.

BETABION

Vitamina B₁ pura, crist.: polineuriti, nevralgie, herpes zoster, turbe cardiovascolari da avitaminosi, paralisi, ecc.

Rp.:

tubo di 20 e flac. di 100 compr. di 3 mg,
scat. di 3 e di 15 fiale di 5 mg in 1 cc.
4-6 compr. al dì o 1-2 fiale pro die endomuscolo, endovena.

BETABION « FORTE »

tubo di 10 e flac. di 50 compr. di 50 mg,
scat. di 3 e di 15 fiale di 25 mg in 1 cc.
1-4 compr. pro die o 1-2 fiale al dì endomuscolo, endovena.

BETABION « FORTISSIMUM »

scat. di 3 e di 15 fiale di 100 mg in 2 cc.
1 fiala pro die preferibilmente endomuscolo.

BILAMID

Amide ossimetilica dell'acido piridin-3-carbonico: contro flogosi epato-bili-enteriche. Combatte la dispepsia da latte dei lattanti. Assieme a Piridacil (vedasi questo) contro pielite, pielocistite.

Rp.:

tubo di 20 compresse di 0,5 g,

scat. di 5 fiale di 10 cc soluzione al 4 %.

1-2 compr. 3 volte al dì dopo i pasti; si possono inoltre somministrare, solo endovena, 1-2 fiale pro die. Ai lattanti 1 compr. al dì frazionata in 3-4 volte.

BILAMID-COLINA

Amide ossimetilica dell'acido piridin-3-carbonico e colina - Epatopatie infettive e tossiche, epatiti sierose, stati postepatitici e precirrotici, steatosi epatica, dermatosi da alterato ricambio, vomito gravidico, eclampsia, male da raggi, ecc.

Rp.:

Confetti: flac. di 60 confetti.

4 volte al giorno 2-4 confetti durante i pasti.

Granulato: flac. di 50 g (con misurino).

1-2 misurini al giorno durante i pasti.

CARBONE COMPOSTO-CILAG al Guanicil

Antidiarroico, antibacillare; contro le malattie gastrointestinali specie bacillari.

Compresse: *carbone medic.* 0,13 g, *Guanicil* 0,13 g, *bismuto sottonitrato* 0,04 g, *pectina* 0,04 g, *glucosio ed eccip.* q. b. a 0,70 g.

Granulato: *carbone medic.* 10 g, *Guanicil* 7,5 g, *bismuto sottonitrato* 2,5 g, *caolino* 5 g, *pectina* 2,5 g, *glucosio ad 50 g.*

Rp.:

Compresse: tubo di 20 compresse.

Agli adulti subito 3 compr., dopo 2 ore 2 compr., indi ogni 3 ore 2 compr.; ai bambini metà dose.

Granulato: barattolo di 50 g.

Agli adulti 3-4 cucchiari pro die; ai bambini metà dose.

CEBION

Vitamina C pura, crist.: diatesi emorragiche, anemie ipocromiche, stanchezza primaverile, malattie infettive (grippe, polmonite, difterite, tubercolosi, ecc.), ulcera gastroduodenale, malattie reumatiche, intossicazioni, turbe endocrine, gengiviti, turbe della dentizione, ecc.

Rp.:

tubo di 20 e flac. di 100 compr. di 50 mg,
scat. di 10 fiale di 50 mg in 1 cc e di 5 fiale di 100 mg in 2 cc.
Per profilassi 1-2 ed anche più compr. al dì; per terapia 1 o più fiale al dì endovena, sottocute o endomuscolo.

CEBION « FORTE »

tubo di 10 e flac. di 50 compr. di 200 mg,
scat. di 3, di 10 e di 15 fiale di 500 mg in 5 cc.
3-5 compr. al dì; 1-2 o più fiale al dì endovena, sottocute o endomuscolo.

CEBION « FORTISSIMUM »

tubo di 10 compr. di 500 mg,
scat. di 3 fiale di 1 g in 5 cc.
1-2 compr. al dì; 1 o più fiale pro die endovena o endomuscolo.

CEBION-PASTA

tubo di 15 g circa.
Con la quantità di un pisello eseguire massaggio sulle gengive 3-4 volte al dì.

CICLOVALIDIN (novità)

Cicloserina di sintesi (d-4-amino-3-isossazolidone) - Antibiotico a largo spettro d'azione antimicrobica, elettivo contro il mycobacterium tuberculosis, specie contro ceppi resistenti ad altri antibiotici e chemioterapici.

Rp.:

flaconi di 12 e di 40 compresse di 0,25 g.

Iniziare con una compressa al dì per una settimana ed aumentare progressivamente sino a 3-4 compresse pro die entro i successivi 7 giorni.

Nei bambini non superare la dose di 10 mg/kg pro die.

DIASULFON

Sulfametazina, sulfadiazina, solfone N-acetato. La prima associazione di sulfamidi con solfone ad attività chemioterapica sinergica, ad ampio spettro e ad effetto protratto. Bronchiti, polmoniti, broncopolmoniti, flogosi epato-bili-enteriche, cistopieliti, grippe, ecc.

Rp.:

tubo di 12 compresse di 0,75 g.

Adulti: subito 2 compresse, poi 1 compressa ogni 6 ore sino a sfebbramento, continuare con metà dose per qualche giorno ancora. Ragazzi e bambini in proporzione all'età ed al peso.

DIASULFON-SCIROPPO al 10 %

flacone di 100 cc.

Lattanti: inizialmente $\frac{1}{2}$ cucchiaino, continuare con $\frac{1}{2}$ cucchiaino ogni 8 ore fino a sfebbramento, indi $\frac{1}{2}$ cucchiaino ogni 12 ore per qualche giorno ancora.

Bambini: inizialmente 2 cucchiaini, continuare con 1 cucchiaino ogni 6 ore sino a sfebbramento, indi 1 cucchiaino ogni 8 ore per qualche giorno ancora.

Ragazzi e adulti: 3 cucchiaini e più al dì.

DIAZIL

2-(p-aminobenzolsolfanilamino)-4,6-dimetilpirimidina. Il più tollerato ed il più attivo solfonamidico. Contro broncopolmonite, polmonite, meningite, gonorrea, erisipela, cistopielite, sepsi lenta, piuria, ecc.

Rp.:

Comprese

tubo di 20 compresse di 0,5 g.

Adulti: subito 4-6 compr., poi 2 compr. ogni 4 ore o 3 ogni 6 ore. Ragazzi e bambini in proporzione all'età e al peso.

Fiale

scat. di 5 fiale di 5 cc soluz. al 20 %.

Adulti: 1-3 fiale pro die endomuscolo o endovena. Ragazzi e bambini in proporzione al peso e all'età.

Supposte per adulti

scat. di 10 supp. di 1 g.

Subito 2 supp., indi 1 supp. ogni 3 ore, poi ogni 6 ore.

Supposte per bambini

scat. di 10 supposte di 0,5 g.

Subito 1-2 supposte, indi 1 supp. ogni 3 ore, poi ogni 6 ore.

Sostanza per ricettazione

flac. di 10, 50, 100 g di Diazil e Diazil sodico.

(Diazil, segue)

(Diazil, seguito)

DIAZIL SCIROPPO al 10 %

flac. di 100 g.

Lattanti 3-4 cucchiaini nelle 24 ore; bambini 1 cucchiaino ogni 4 ore; ragazzi 1 cucchiaino ogni 3 ore; adulti 1 cucchiaino e più ogni 3 ore.

1 cucchiaino di sciroppo corrisponde a circa 0,5 g di sostanza attiva, pari ad 1 compressa di Diazil.

DIAZIL-POLVERE per uso chirurgico

flaconcino di 3 g.

Sostanza sterile priva di eccipienti per uso topico in cavità operatorie, piaghe, ferite, ecc.

DIAZIL-POMATA OFTALMICA al 5 %

tubo di 10 g.

Contro le infezioni batteriche degli occhi: introdurre sotto le palpebre quanto un chicco di grano, indi massaggiare.

DIAZIL-PENICILLINA

Chemio-antibiotico terapeutico attivo per via orale. - Una compressa contiene: 0,5 g di Diazil e 100.000 U. I. di penicillina G procaina. Associata a Diazil la penicillina è attiva anche per via orale ed anche contro batteri penicillino-resistenti. - Polmoniti, broncopolmoniti, tonsilliti, meningiti, ecc.

Rp.: tubo di 12 compresse.

Inizialmente 3-4 compr., poi 2 compr. 3-4 volte al giorno. Dare contemporaneamente liquidi alcalini abbondanti.

DIGIMERCK

Digitossina pura, crist. «Merck». Regolatore e tonico del cuore: insufficienza cardiaca cronica e acuta, ipotonia del miocardio durante malattie infettive, ecc.

Rp.:

tubo di 20 compr. di 0,1 mg,
scat. di 5 e di 10 supposte di 0,25 mg,
scat. di 5 fiale di 0,25 mg in 1 cc.

Posologia strettamente individuale.

DIGIMERCK-GOCCE

flaconcino contagocce di 10 cc (1 cc = 30 gocce = $\frac{1}{10}$ di mg di digitossina).

Posologia strettamente individuale.

EUPAVERINA

1-benzil-3-etil-6,7-dimetossi-isochinolina; le compresse contengono la base, le fiale il solfato. - Spasmolitico della muscolatura liscia, specie dei vasi arteriosi: embolie, infarti, alterazioni gravi dell'emodinamia, coliche, ecc.

Rp.:

tubi di 10 e di 20 compr. di 0,03 g,
scat. di 5 e di 10 fiale di 0,03 g in 1 cc.
1-2 compr. 1-3 volte al dì (ai bambini metà dose); 1-2 fiale endomuscolo o lentamente endovena.

EUPAVERINA « FORTE »

scat. di 5 fiale di 0,15 g in 5 cc.
Contro embolie, lentamente endovena 1 fiala più volte al dì.

EVION

Vitamina E: α -tocoferolo acetato di sintesi - Aborto abituale, diatesi all'aborto, sterilità, neuromiopatie, turbe della virilità e del climaterio, turbe vasali periferiche, debilità senile, ulcus cruris, sclerodermie, ecc.

Rp.: tubo di 20 confetti di 10 mg,
scat. di 5 fiale di 30 mg in 1 cc.
1-3 confetti pro die, oppure 1 fiala al dì endomuscolo.

EVION « FORTE »

tubo di 10 e flac. di 20 conf. di 100 mg,
scat. di 5 fiale di 300 mg in 2 cc.

Contro malattie neuromuscolari, turbe dell'irrorazione sanguigna, malattie degenerative del tessuto connettivo, 3 conf. al dì eventualmente anche per mesi, oppure 1 fiala al dì.

GEROBION (novità)

Associazione di vitamine e sostanze lipotrope. - Stati di carenza vitaminica, malattie infettive, convalescenze, errori dietetici, astenie, turbe dell'età avanzata, ecc.

Rp.:

flac. di 30 capsule.
Per la profilassi 1 capsula 1-2 volte al dì, per la terapia 1 capsula 3 volte o più al dì, durante o dopo i pasti.

HEPRACTON B₁₂

Estratto integrale di fegato con aggiunta di vitamina B₁₂ (10 γ pro cc), vitamina B₁, vitamina B₂ e amide dell'acido nicotinico - Anemia perniciosa, anemia gravidica ed anemie secondarie specie per affezioni croniche, azotemia, sprue, stati di deperimento, epatosi, ecc.

Rp.: scat. di 5 fiale di 2 cc,
scat. di 3 fiale di 5 cc.

Profondamente nei glutei 2 cc pro die, indi a giorni alterni, oppure 5-10 cc la settimana.

ILVIN (novità)

Maleato di 1-(2'-piridil)-1-(p-bromofenil)-3-dimetilaminopropano - Antistaminico, antiallergico: asma bronchiale, enfisema bronchitico. Gastroenterite allergica, dermatosi pruriginose, orticaria, eczema allergico, esantema da siero, rinite vasomotoria, allergia da infusioni e trasfusioni, punture di insetti, scottature da sole, ecc.

Rp.: tubo di 10 e flac. di 20 duplette di 16 mg,
scatola di 3 fiale di 5 mg,
Ilvin-gel: tubo di 20 g al 2%.

In genere 2 duplette (confetti a doppio strato attivo) al dì. Contro manifestazioni intense anche 3 duplette al dì. Per la terapia di attacco di forme allergiche gravi iniettare endomuscolo, sottocute o lentissimamente endovena una fiala 1 o 2 volte al dì. Per uso topico applicare sulla cute, più volte al dì, un sottile strato di Ilvin-gel.

LYSOBEX

Bromuro di trimetil-(1,2-difeniletossietil)-ammonio. - Stati di irritazione delle vie aeree superiori. Tosse per fenomeni acuti o cronici di rino-faringite, di bronchite, di broncopolmonite. Tosse dei tubercolotici. Pertosse o tosse postuma a pertosse. Tossi stizzose riflesse da irritazione pleurica, bronchiale e mediastinica. Tosse cronica dei fumatori.

Rp.:

flaconcino contagocce di 15 cc (1 cc = 0,12 g),
scatola di 30 confetti di 0,03 g.

Lattanti: 1-3 gocce 2-3 volte al dì. Bambini: 4-5 gocce 2-3 volte al dì. Ragazzi e adulti: 10 gocce e più, oppure 1-2 confetti 2-3 volte al dì lontano dai pasti; per forme più gravi può essere aumentata la singola dose anche a 15-20 gocce o a 2-3 confetti. Diluire le gocce in liquidi gradevoli.

LYSOBEX-SCIROPPO

flac. di 150 cc.

Lattanti mezzo cucchiaino da caffè 2-3 volte al dì; bambini 1 cucchiaino 2-3 volte al dì; ragazzi ed adulti 1 cucchiaino da frutta 2-3 volte al dì, lontano dai pasti.

LYSPAMIN

1-nicotilamino-1,2-difeniletano + feniletilmalonilurea. - Spasmodico della muscolatura liscia e striata: spasmi del sistema circolatorio, specie angina pectoris, delle vie biliari, dell'apparato digerente e urinario; pseudocroup, pilorospatmo dei lat-tanti, ecc.

Rp.:

tubo di 10 compr. di 0,30 g,
scat. di 5 supposte di 0,50 g.
1/2-1 compr. 3-4 volte al dì; 2-3 supposte pro die.

LYSPAMIN PER USO PEDIATRICO

Non contiene feniletilmalonilurea.
Scat. di 5 supposte di 0,40 g.
1-3 supposte al dì.

LYSPAMIN « FORTE »

Non contiene feniletilmalonilurea.
Scat. di 2 e di 6 supposte di 1 g.
1-2 supposte durante il periodo di dilatazione, o secondo necessità nelle altre indicazioni.

MAGNORBIN

Magnesio ascorbato per iniezioni. - Tetano, spasmofilia, spasmi vasali, ipertensione, distonia vegetativa, epilessia, turbe della circolazione periferica, narcosi, osmotherapia, reazioni flogistiche cutanee, malattie allergiche, eclampsia, ecc.

Rp.:

scat. di 5 fiale di 5 cc al 10 %,
scat. di 5 fiale di 5 cc al 20 %.

Posologia secondo le indicazioni; la soluzione al 10 % è indicata nei casi meno gravi, mentre quella al 20 % è indicata per ottenere un effetto più intenso.

PIRALDINA

Amide dell'acido pirazincarbonico - Chemioterapico coadiuvante la terapia della malattia tubercolare, specie delle forme pas-isoniazido-streptomycin-resistenti.

Rp.:

flac. di 50 compresse di 0,50 g.
Adulti: 5-6 compresse al giorno, ripartite in 3 dosi, preferibilmente dopo i pasti. Ragazzi e bambini: in proporzione all'età ed al peso.

PIRIDACIL

Cloridr. della 3-fenilazo-2,6-diaminopiridina. Antisettico perorale con spiccato tropismo per reni e vescica. Contro cistite, pielite, cistopielite, pielonefrite (assieme a Bilamid, vedasi questo), fluor cervicale, ecc.

Rp.: tubo di 20 confetti di 0,1 g.

Bambini 1-2 confetti, ragazzi 2-4, adulti 2 confetti 3-4 volte al dì, dopo i pasti.

POLYBION

Combinazione delle principali sostanze attive del complesso B dosate secondo necessità fisiologica.

Convalescenza, deficienza di peso, senilità, gravidanza, ipertireosi, stomatite, glossite, epatopatie parenchimatose, anoressia ostinata, sindromi neurodistrofiche, vomito gravidico, male da raggi, ecc.

1 confetto di Polybion contiene: vit. B₁ (aneurina) 5 mg - vit. B₂ (lattoflavina) 2 mg - vit. B₆ (adermina) 2 mg - amide dell'acido nicotinico 20 mg - sale calcico dell'ac. pantotenico 3 mg.

1 fiala I contiene: vit. B₁ 10 mg - amide dell'acido nicotinico 40 mg - vit. B₆ 4 mg.

1 fiala II contiene: vit. B₂ 4 mg - pantotenolo 6 mg.

Rp.:

flac. di 20 confetti,

scat. di 5 fiale I e 5 fiale II.

1 conf. 3 volte al dì, ai bambini metà dose; 1 volta al dì endomuscolo o in vena la miscela delle due fiale.

POLYBION-GOCCE

1 flaconcino di 20 cc di Polybion-gocce contiene: vit. B₁ 50 mg - vit. B₂ 10 mg - vit. B₆ 20 mg - amide dell'ac. nicotinico 150 mg - pantotenolo 30 mg.

Rp.:

flac. contagocce di 20 cc.

10-15 gocce tre volte al dì, ai bambini metà dose, ai lattanti 5 gocce 3 volte al dì.

POLYBION « FORTE »

1 confetto di Polybion « forte » contiene: vit. B₁ 15 mg - vit. B₂ 15 mg - vit. B₆ 10 mg - amide dell'ac. nicotinico 50 mg - sale calcico dell'ac. pantotenico 25 mg.

Rp.:

flac. di 20 confetti.

1 confetto 3 volte al dì.

SCIROPPO "MERCK" all'Efetonina contro la tosse

Contro ogni forma acuta e cronica di tosse, pertosse, bronchite, raffreddore, ecc. - Efetonina 0,2% in sciroppo di timo e ipecacuana.

Rp.:

flacone originale.

Bambini sino ai 3 anni, 2-3 volte al dì $\frac{1}{2}$ cucchiaino; ragazzi, 3-4 volte al dì $\frac{1}{2}$ -1 cucchiaino; adulti, 4 volte al dì 1-2 cucchiaini.

STRAMINOL

Cloruro di dodecil-carbamil-metil-benzil-dimetilammonio. Detergente, disinfettante, antisettico, battericida, fungicida: per la disinfezione e la sterilizzazione delle mani e della cute, di strumenti chirurgici, biancheria, stoviglie, per irrigazioni vaginali, vescicali, per il trattamento di ferite, per prevenire e curare affezioni infiammatorie della bocca e della faringe.

Rp.:

Sostanza

scatola di 10 bustine di 1 g.

Soluzione acquosa al 10 %

flacone di 100 cc.

Unguento vulnerario allo 0,1 %

tubo di 20 g.

Polvere vulneraria all'1 %

barattolo di 20 g.

Tintura all'1 %

flacone contagocce di 20 cc.

Compresse di 1 mg

scatola di 30 compresse.

Collutorio al 4 %

flaconi spruzzatori di 20 e di 50 cc.

ALTRE SPECIALITÀ

CILOPRIN - flac. di 6 g

Chemioterapico per uso topico. Otitis purulenta.

CREMA « MERCK » all'Efetonina - tubo di 15 g

Raffreddori.

CYTOBION - 3 fiale

Vitamina B₁₂. Anemia perniciosa.

CYTOBION « forte » - 3 fiale

Vitamina B₁₂. Anemia perniciosa.

CYTOBION « fortissimum » - 1 fiala

Vitamina B₁₂. Mielosi funicolare, nevralgie.

DESULAN - 14 compr. ovoid.

Chemioterapico per uso topico. Vaginiti, fluor.

DIOGENAL - flaconcino di 1 g

Narcosi endovenosa.

DIONINA - 20 compr. - 10 fiale

Sedativo della tosse.

DORYL - 20 compr. - 10 fiale - flac. di 10 cc

Parasimpaticotonico. Atonie intestinali e vescicali.

EFEDRALINA - 3 e 10 fiale

Simpaticotonico. Ipotonia circolatoria grave.

EFEDRINA « MERCK » - 10 e 20 compr. - 10 fiale

Simpaticotonico. Ipotonia circolatoria, asma bronchiale.

EFETONINA - 10 e 20 compr. - 50 perline - 10 fiale

Simpaticotonico. Ipotonia circolatoria, asma bronchiale.

EGRESSIN - 6 e 12 compr.

Ossiuriasi.

EMEDIAN - 20 e 100 confetti

Distonie vegetative.

ESTROMENIN - 20 compr. - 5 fiale

Estrogeno di sintesi. Amenorrea, dismenorrea.

ESTROMENIN « forte » - 5 fiale

Estrogeno di sintesi. Amenorrea, dismenorrea.

ESTROMENIN-gocce - flac. di 20 cc

Estrogeno di sintesi. Amenorrea, dismenorrea.

ESTROMENIN-unguento - tubo di 20 g

Estrogeno di sintesi. Craurosi vulvare, ragadi.

ALTRE SPECIALITÀ

ESTROMENIN-deposito - 3 fiale

Estrogeno di sintesi. Amenorrea, carcinoma della prostata.

EUBOLDINA - 50 perline

Ipofunzionalità epato-bili-enterica, stitichezza.

EUCODALE (stupefacente) - 10 e 20 compr. di 0,005 g -
2, 5 e 10 fiale di 0,01 g - 2, 5 e 10 fiale di 0,02 g

Analgesico.

EUPACO - 10 e 20 compr. - 3 e 10 fiale - 5 e 10 supp.

Spasmolitico.

GLICEROFOSFATO DI CALCIO « MERCK » - flac. di 25 g

Tonico generale.

GUANICIL - 20 compr.

Sulfamidico. Dissenteria bacillare, diarrea.

GUANICIL-sciroppo al 10 % - flac. di 100 g

Sulfamidico. Dissenteria bacillare, diarrea.

HEXOBION - 20 compr. - 3 fiale - 5 e 10 supp.

Vitamina B₆. Iperemesi gravidica, cinetosi.

IDRAZIL - 50 compr.

Chemioterapico antitubercolare.

ISOPIRALDINA - 50 compr.

Chemioterapico antitubercolare.

KARANUM - 20 compr. - 5 fiale

Vitamina K antiemorragipara.

LAMBRATENE - 3 fiale - 30 e 60 confetti

Profilassi e terapia del male da raggi.

LUMINALE - 10 compr. di 0,10 g - 10 compr. di 0,30 g -
10 fiale

Sedativo, ipnotico, antiepilettico.

LUMINALETTE - 30 compr.

Sedativo, ipnotico, antiepilettico.

ELISIR DI LUMINALE - flac. originale

Sedativo, ipnotico, antiepilettico.

METURAL - 18 e 36 compr.

Stomatiti, tonsilliti, laringiti.

ALTRE SPECIALITÀ

MINDOL-MERCK - bustina di 2, tubo di 10 e flac. di 50 compr.

Antipiretico, antineuralgico, antigrippale.

NICOTA - 10 compr. - 10 fiale

Vitamina PP. Epatopatie, angiospasmii.

OPTONICUM - flac. originale

Anemie secondarie, convalescenze.

PANODORM - 10 compr.

Ipnotico.

PANODORM-CALCIUM - 10 compr.

Ipnotico.

PAS-CILAG - 100 compr. - 5 fiale

Chemioterapico antitubercolare.

PERMEASE - 2 fiale

Fattore diffusore per facilitare l'ipodermoclisi.

PROMINAL - 10 e 50 compr.

Sedativo, antiepilettico.

PROMINALETTE - 30 compr.

Sedativo, antiepilettico.

SCOFEDAL (stupefacente) - 10 fiale

Narcosi basale.

SCOFEDAL « forte » (stupefacente) - 10 fiale

Narcosi basale.

SOLFONE-CILAG - 5 fiale

Chemioterapico antibatterico ed antitubercolare.

STIPTICINA - 20 conf. - 5 fiale

Emostatico.

ULTRACARBO - baratt. di 50 g - 50 compr.

Diarree, intossicazioni, avvelenamenti.

VACCINO POLIOMIELITICO « CONNAUGHT »

1 fiala di 1 cc - flac. di 10 cc

Per vaccinazione antipoliomielitica.

VIGANTOLO - flac. di 10 cc - 50 conf.

Vitamina D₂. Rachitismo, spasmofilia.

VIGANTOLO « forte » - 1 fiala

Vitamina D₂. Rachitismo, spasmofilia, tubercolosi.

VIGANTOLO « fortissimum » - 1 fiala

Vitamina D₂. Rachitismo, spasmofilia, tubercolosi.

MEZZI DI CONTRASTO

- CISTOBIL** - tubo di 1 dose (6 compr.)
Sostanza triiodata per colecistografia per os.
- ENDOCISTOBIL** - 1 fiala di 20 cc
Sostanza bis-triiodata per colecisto-colangiografia per via endovenosa - Soluzione al 50%.
- JODOBIL** - flac. di 1 dose
Sostanza diiodata per colecistografia per os.
- JODURON 20 %** - 1 fiala di 10 cc
Sostanza diiodata per pielografia retrograda.
- JODURON 30 %** - 1 fiala di 5, 10 e 20 cc
Sostanza diiodata per urografia endovenosa, angiografia.
- JODURON 50 %** - 1 fiala di 10 e 20 cc
Sostanza diiodata per urografia endovenosa, angiografia.
- JODURON 70 %** - 1 fiala di 10 e 20 cc - flac. di 50 cc
Sostanza diiodata per urografia endovenosa, angiografia, angiocardiopneumografia.
- JODURON « B »** - flac. di 20 e di 100 cc
Sostanza diiodata idrosolubile per broncografia.
- JODURON « S »** - 1 fiala di 5 e di 10 cc
Sostanza diiodata idrosolubile per isterosalpingografia.
- NEOBARIO** - scat. di 150 g
Mezzo di contrasto per l'esame della mucosa gastroenterica.
- PROPYLIODON-Cilag** - flac. di 20 cc
Sospensione acquosa microcristallina per broncografia.
- TRIOPAC « 200 »** - 1 fiala di 20 cc
Sostanza triiodata per urografia endovenosa, angiografia.
- TRIOPAC « 300 »** - 1 fiala di 20 cc
Sostanza triiodata per urografia endovenosa, angiografia.
- TRIOPAC « 400 »** - 1 fiala di 20 cc
Sostanza triiodata per urografia endovenosa, angiografia, angiocardiopneumografia.

